



BOTOX w leczeniu nadpotliwości

Leczenie nadpotliwości za pomocą toksyny botulinowej jest to sposób uważany obecnie za przynoszący najlepsze rezultaty i obarczony małym ryzykiem.

Celem leczenia nadpotliwości jest zablokowanie nerwów zaopatrujących gruczoły wydzielania zewnętrznego w miejscach poddanych zabiegowi, co w efekcie prowadzi do uniemożliwienia nadmiernego wydzielania potu. Terapia opiera się na kilku powtarzających się zabiegach, które prowadzą do całkowitej zmiany funkcjonowania gruczołów potowych i tym samym do zatrzymania wydzielania potu.

NA JAKIE PARTIE MOŻNA WYKONAĆ ZABIEG?

- okolice pach
- dłonie
- stopy
- owłosiona skóra głowy

ZASTOSOWANIE

- leczenie miejscowej nadpotliwości

PRZEBIEG ZABIEGU

Zabieg z użyciem toksyny botulinowej trwa zazwyczaj do 30 minut.

Ponieważ iniekcje w okolicy dłoni i stóp są stosunkowo bolesne, można zastosować znieczulenie miejscowe w tych okolicach. W przypadku okolicy pach zwykle nie ma takiej potrzeby.

Po dokładnym oczyszczeniu i dezynfekcji skóry, w wielu miejscach wstrzykuje się śródskór-

nie określoną dawkę toksyny botulinowej. W zależności od wielkości obszaru zakwalifikowanego zabiegowi wykonuje się 20-30 iniekcji w obrębie pach lub 35-40 w przypadku dłoni i stóp.

Pierwsze efekty są widoczne 2-10 dni po zabiegu, a pełne rezultaty można zaobserwować po ok. 14 dniach. U większości pacjentów efekt utrzymuje się około 6 miesięcy, a w przypadku pachy może utrzymywać się nawet do roku. Po tym czasie wymaga powtórzenia.

PRZED ZABIEGIEM

- 7 dni przed zabiegiem nie należy stosować NLPZ, leków przeciwkrzepliwych, antykoagulantów oraz aspiryny, witaminy E i innych obniżających krzepliwość krwi na 7-10 dni przed zabiegiem (nie dotyczy pacjentów po udarze lub zawale)

ZALECENIA PO ZABIEGU

- przez 6 h unikać schylania się, skakania, leżenia oraz dotykania obszaru poddanego zabiegowi (nie masować i uciskać)
- powstrzymanie się od intensywnych ćwiczeń przynajmniej przez 3 dni po zabiegu
- unikanie słońca, solarium, sauny, gorących kąpeli, krioterapii, nurkowania i zmian ciśnienia
- bezpośrednio po zabiegu należy utrzymywać miejsce iniekcji w szczególnej czystości, nie dotykać miejsca wkłucia brudnymi rękami
- unikanie bliskiego kontaktu ze zwierzętami oraz zanieczyszczonymi powierzchniami przez kilka dni po zabiegu



BOTOX w leczeniu nadpotliwości

- nie spożywać alkoholu 24-48 h po zabiegu
- 7-14 dni po zabiegu nadal nie stosować NLPZ
- DOZWOLONE LEKI PRZECIWBÓLOWE PO ZABIEGU: TRAMADOL, PARACETAMOL (APAP)

Leczenie nadpotliwości przy użyciu botoxu wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań dlatego przed zabiegiem nasz lekarz przeprowadzi z Tobą wnikliwą rozmowę, by wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu i zminimalizować ryzyko powikłań.